



Opinia
Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych
nr 19/2012 z dnia 30 stycznia 2012 r.
o projekcie programu zdrowotnego
„Program prorodzinny przygotowujący przyszłych rodziców
na przyjęcie dziecka”
przygotowanym przez miasto Legionowo

Po zapoznaniu się z opinią Rady Konsultacyjnej uważam, że projekt programu zdrowotnego „Program prorodzinny przygotowujący przyszłych rodziców na przyjęcie dziecka” realizowany w ramach „Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok 2011” dotyczy istotnego problemu społecznego i zdrowotnego, jednakże z uwagi na niedostateczny opis programu nie może być pozytywnie zaopiniowany.

W opiniowanym projekcie, problem zdrowotny, któremu mają zapobiegać proponowane działania profilaktyczne, nie został jednolicie zdefiniowany. Zakres oczekiwanych założeń programu obejmuje różnorodne skutki: od przygotowania do porodu i podniesienia poziomu edukacji, poprzez poprawę stanu zdrowia ciężarnych i noworodków, po zmniejszenie liczby powikłań okołoporodowych.

Program przewiduje finansowanie lub dofinansowywanie edukacji przedporodowej w szkołach rodzenia w populacji kobiet w ciąży. Ukierunkowany jest na ogólnie rozumiane przygotowanie do porodu i porodu. W szczególności wnioskowany projekt stanowi uzupełnienie działań szkół rodzenia między innymi o działania z zakresu profilaktyki chorób narządu żucia, a także o edukację dotyczącą problemu nikotynizmu i związanych z nim szkód zdrowotnych dla matki, oczekiwanego dziecka i członków rodziny.

Zdrowie jamy ustnej jest istotnym elementem ogólnego stanu zdrowia kobiet w ciąży i kobiet w wieku rozrodczym. Zmiany fizjologiczne zachodzące podczas ciąży mogą stanowić ogromne obciążenie dla organizmu kobiety, w tym dla jamy ustnej. Zły stan zdrowia jamy ustnej matki, obejmujący próchnicę oraz choroby przyzębia przed i w czasie ciąży, jest związany z następstwami, takimi jak przedwczesny poród i niska masa urodzeniowa dziecka.¹

Choroby przyzębia to infekcje bakteryjne, które w skali światowej są wykrywane średnio u 30% kobiet ciężarnych i które mogą prowadzić do uszkodzenia dziąseł i kości. Choroby przyzębia mogą przyczynić się do przedwczesnego porodu (poniżej 37 tygodnia ciąży) oraz niskiej masy urodzeniowej, co z kolei może powodować znaczącą śmiertelność wśród noworodków oraz komplikacje zdrowotne w okresie rozwojowym.^{3,4}

Próchnica jest przewlekłą chorobą bakteryjną, która może dotyczyć ludzi we wszystkich grupach wiekowych. Zmiana nawyków żywieniowych oraz higienicznych w trakcie ciąży również może powodować rozwój próchnicy. Dodatkowo nudności i wymioty występujące w trakcie ciąży mogą powodować nadmierną erozję powierzchni zębów, prowadzącą do pogarszającego się stanu zdrowia jamy ustnej. Leczenie próchnicy u kobiety ciężarnej nie tylko wpływa na poprawę zdrowia kobiety, ale także zapobiega transmisji bakterii odpowiedzialnych za rozwój próchnicy u dziecka.¹

Odnośnie nikotynizmu, palenie tytoniu w okresie ciąży jest związane z wieloma problemami zdrowotnymi noworodków, takimi jak: wady serca i sercowo-naczyniowe, zaburzenia kostno-szkieletowe, skrócenie długości kończyn, brakujące lub dodatkowe palce, stopa koślawo-szpotała,



kraniosynostoza, deformacje twarzy, wady wzroku, rozszczep wargi i podniebienia, wadu jelitowo-żołądkowe, wytrzewienie, atrezja odbytu, przepuklina, niezstąpienie jąder.⁵

Misją szkoły rodzenia jest ukształtowanie nawyków sprzyjających utrzymaniu dobrostanu psychofizycznego ciężarnej, rodzącej oraz jej rodziny. Zadanie to powinno być realizowane poprzez edukację przygotowującą przyszłą matkę i ojca dziecka do porodu, połogu i opieki nad noworodkiem.¹

W czasie zajęć teoretycznych ciężarna wraz z ojcem dziecka powinna poznać mechanizm porodu, zasady opieki poporodowej, zaznajomić się z okresem karmienia i metodami antykoncepcji, które mogą być stosowane po porodzie.

W czasie zajęć praktycznych ciężarna wraz z ojcem dziecka powinna stosować gimnastykę ogólnousprawniającą, poznać pozycje relaksacyjne, sposoby oddychania i parcia w różnych okresach porodu, poznać zasady pielęgnacji noworodka (bezpieczne chwytty noworodka, kąpiel, układanie noworodka itp.). Ponadto powinna zaznajomić się z warunkami sali porodowej, w której będzie odbywała poród.¹

W cytowanych wytycznych odnaleziono również inne wskazówki dotyczące zakresu informacji istotnych dla ciężarnej:¹

- lekarz sprawujący opiekę nad kobietą ciężarną powinien udzielać porad dotyczących żywienia i suplementacji witaminowo-mineralnej;
- pacjentka powinna być informowana o sytuacjach, w których należy ograniczyć wysiłek fizyczny, szczególnie w przypadkach wystąpienia objawów poronienia zagrażającego lub zagrożenia porodem przedwczesnym;
- konieczne jest zwrócenie uwagi pacjentki na możliwość zmiany stanowiska pracy, a nawet odsunięcie od aktywności zawodowej, jeśli uzasadnia to stopień zagrożenia lub przepisy prawa;
- zalecane jest poinformowanie pacjentki o rodzaju niepokojących objawów mogących towarzyszyć zagrożeniom powstałym w wyniku kontaktu seksualnego w czasie ciąży.

Powyższe zalecenia kliniczne oparto na licznych rekomendacjach, w tym: ACOD (2010),¹⁴ JCSI (2009),¹³ PTG(2005),⁸ NCCWCH/NICE (2008),⁹ HAS (2005).^{10,11,12}

Finansowanie szkół rodzenia (pod warunkiem ich skuteczności) przez jednostki samorządu terytorialnego wydaje się zbieżne z celem operacyjnym nr 7 Narodowego Programu Zdrowia (NPZ) na lata 2007-2015, sformułowanym jako „Poprawa opieki zdrowotnej nad matką, noworodkiem i małym dzieckiem”; wśród zadań wymieniono kształtowanie prozdrowotnych postaw i przeciwdziałanie antyzdrowotnym zachowaniom przyszłych rodziców w okresie przedkonceptyjnym, w czasie ciąży, opieki nad niemowlęciem i małym dzieckiem oraz propagowanie karmienia piersią (co najmniej do 6 miesiąca życia). Administracja samorządowa, w myśl dokumentów programowych NPZ, ma być jednym z podmiotów odpowiedzialnych za realizację wspomnianego celu. Ponadto samorząd terytorialny poszczególnych szczebli zobowiązany jest do realizowania zadań dotyczących promocji i ochrony zdrowia oraz polityki prorodzinnej. „Poprawa jakości i skuteczności opieki zdrowotnej nad matką, noworodkiem i dzieckiem do lat 3” należy do priorytetów zdrowotnych określonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia.^{1,6}

Wskaźnikami poziomu opieki perinatalnej są umieralność okołoporodowa płodów i noworodków oraz zgony matek w okresie ciąży, porodu i połogu.

Współczynniki umieralności okołoporodowej w Polsce (opracowane na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS)) w latach 1999 – 2005 wykazują tendencje spadkowe. W roku 1999 współczynnik dla ogółu Polski wyniósł 10,84‰, natomiast w 2005 r. 8,04‰ (spadek o 26%). Istnieje także zróżnicowanie terytorialne umieralności okołoporodowej. W 1999 roku najwyższą wartość współczynnika odnotowano w województwie dolnośląskim – 13,7‰, natomiast najniższą w województwie warmińsko-mazurskim – 7,9‰. W roku 2005 współczynnik umieralności okołoporodowej najwyższą wartość ponownie osiągnął w województwie dolnośląskim – 9,32‰ w stosunku do wartości najniższej w województwie wielkopolskim – 7,5‰. O zmniejszeniu się

zróżnicowania terytorialnego świadczy dynamika zmian współczynnika umieralności, którego wartość w 1999 r. zawierała się w przedziale od 7,9 do 13,7%, natomiast w 2005 r. – od 5,8 do 9,3%.⁷

Zgodnie z danymi GUS, w Polsce zgony matek w ostatnim dziesięcioleciu kształtowały się na średnim poziomie europejskim – około 10 zgonów/100 tys. żywych urodzeń, a w latach 2001–2004 >8 zgonów/100 tys. żywych urodzeń. W ciągu ostatnich 14 lat obserwowano spadek częstości zgonów matek na 100 tys. żywych urodzeń, jednak w dalszym ciągu cztery zasadnicze bezpośrednie przyczyny zgonów matek (krwotoki, zakażenia, zatory i gęstozy – w latach 1991-2000 odpowiednio 34,7; 25,4; 21,6 i 18,3%) stanowią istotny problemem w opiece perinatalnej.⁷

Podsumowując opinie ekspertów:¹

- Jednym z istotnych czynników wpływających na poprawę opieki perinatalnej jest edukacja przyszłych matek. Nieocenioną rolę w tym zakresie odgrywają szkoły rodzenia, jednak ze względu na brak finansowania tej procedury przez Narodowy Fundusz Zdrowia szkoły rodzenia na terenie całego kraju działają w ograniczonym zakresie.
- Realizacja przez władze samorządowe programów zdrowotnych jest w pełni uzasadniona i celowa oraz może przynieść oczekiwane efekty pod postacią zmniejszenia umieralności noworodków.
- Programy są kierowane do określonej grupy – kobiet w okresie okołoporodowym, ich mężów/partnerów. Cechą charakterystyczną tych programów jest szerzenie oświaty zdrowotnej w obszarze edukacji przedporodowej określonej społeczności lokalnej.

Głównym celem omawianego projektu jest zredukowanie nadmiernego lęku przed porodem oraz pomoc w pokonaniu rozmaitych oporów związanych z „obcowaniem z małym dzieckiem”. Projekt jest skierowany do przyszłych rodziców z terenu miasta Legionowo. Autorzy projektu wśród proponowanych działań wymieniają zapewnienie 50% dofinansowania zajęć prowadzonych w ramach szkoły rodzenia.²

Komentarz analityczny:²

Program odnosi się do ważnego i dobrze zdefiniowanego w literaturze problemu zdrowotnego, ponadto realizuje priorytety Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007-2015.

Projekt nie zawiera jednak dokładnych informacji dotyczących: jego celów szczegółowych, epidemiologii, liczebności populacji docelowej, kryteriów włączenia do programu, działań planowanych w ramach szkoły rodzenia, kryteriów wyboru realizatora, wskaźników monitorowania realizacji oraz efektów programu.

Piśmiennictwo

1. Programy edukacji przedporodowej (szkoły rodzenia) – wspólne podstawy oceny (ocena projektów programów zdrowotnych). Aneks do raportów nr AOTM-OT-186, AOTM-OT-216a, AOTM-OT-441-113/2011, AOTM-OT-441-151/2011. Agencja Oceny Technologii Medycznych, Warszawa styczeń 2012.
2. „Program prorodzinny przygotowujący przyszłych rodziców na przyjęcie dziecka” realizowany przez: Miasto Legionowo (ocena projektu programu). Raport nr: AOTM-OT-P216a. Agencja Oceny Technologii Medycznych, Warszawa styczeń 2012.
3. South Carolina Oral Health Advisory Council & Coalition. Oral Health care for Pregnant Women. 2011.
4. New York State department of Health. Oral Health Care during Pregnancy and Early Childhood. Practice Guidelines. 2006.
5. Huckshaw A., Rodeck C., Boniface S. Maternal smoking in pregnancy and birth defects: a systematic review based on 173 687 malformed cases and 11.7 million controls. Human Reproduction Update 2011, 17(5):589-604.
6. Narodowy Program Zdrowia na lata 2007 - 2015 przyjęty Uchwałą Nr. 90/2007 Rady Ministrów z dnia 15 maja 2007 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007 – 2015.
<http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=&ms=&ml=pl&mi=437&mx=0&ma=243>
7. Raport „Zdrowie kobiet w wieku prokreacyjnym 15–49 lat. Polska 2006”. Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa 2007.
http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/15032007_raport.pdf

8. Komisja Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w zakresie opieki przedporodowej w ciąży o prawidłowym przebiegu. *Gin. Pol.* 2005, 76(7).
9. National Collaborating Centre for Women's and Children's Health, Commissioned by the National Institute for Health and Clinical Excellence. Antenatal care. Routine care for the healthy pregnant woman. March 2008. <http://www.nice.org.uk/CG62>
10. Haute Autorité de Santé. Improving information provision for pregnant women. Clinical practice guideline – quick reference guide. http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_454394/comment-mieux-informer-les-femmes-enceintes
11. Haute Autorité de Santé. Recommandations professionnelles. Comment mieux informer les femmes enceintes? Recommandations. Avril 2005. http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_454394/comment-mieux-informer-les-femmes-enceintes
12. Haute Autorité de Santé. Comment mieux informer les femmes enceintes? Recommandations pour les professionnels de santé. Rapport Complet. Avril 2005. http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_454394/comment-mieux-informer-les-femmes-enceintes
13. Institute for Clinical Systems Improvement. Health Care Guideline. Routine Prenatal Care. 13th Edition. August 2009. <http://www.icsi.org>
14. The American College of Obstetricians and Gynecologists. Committee opinion – Smoking Cessation During Pregnancy. 2010