



Rekomendacja nr 10/2009
Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych
z dnia 14 grudnia 2009r.
w sprawie zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej,
„leczenie ostrych porfirii wątrobowych”, w zakresie programu
zdrowotnego jako świadczenia gwarantowanego

Prezes Agencji rekomenduje zakwalifikowanie świadczenia opieki zdrowotnej „leczenie ostrych porfirii wątrobowych” w zakresie programu zdrowotnego, jako świadczenia gwarantowanego, realizowanego zgodnie z warunkami realizacji zaproponowanymi w zleceniu Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2009 r. (znak pisma: MZ-PLE-460-9759-1/EM/09).

Uzasadnienie

Świadczenie opieki zdrowotnej „leczenie ostrych porfirii wątrobowych” w zakresie programu zdrowotnego, uzyskało pozytywną opinię członków Rady Konsultacyjnej AOTM dla zakwalifikowania go, jako świadczenia gwarantowanego, popartą stosownym stanowiskiem.

Finansowanie ze środków publicznych przedmiotowego świadczenia istotnie poprawi dostęp pacjentów do nowoczesnych terapii w wymienionym schorzeniu, przy zapewnieniu należytego monitorowania pacjentów i optymalizacji wydatkowania finansowych środków publicznych.

Podstawa przygotowania rekomendacji

Rekomendacja została wydana na podstawie art. 31 a-c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008 Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.), na zlecenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2009r. (znak pisma: MZ-PLE-460-9759-1/EM/09), które dotyczyło wydania rekomendacji Prezesa Agencji w sprawie zakwalifikowania przedmiotowego świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego, wraz z określeniem poziomu finansowania w sposób kwotowy albo procentowy lub sposobu jego finansowania, lub warunków jego realizacji po uzyskaniu Stanowiska Rady Konsultacyjnej nr 19/10/26/2009 z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie zasadności zakwalifikowania jako świadczeń gwarantowanych w ramach terapeutycznych programów zdrowotnych Narodowego Funduszu Zdrowia następujących świadczeń: 1. leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych, 2. leczenie ostrych porfirii wątrobowych, 3. leczenie inhibitorami TNF-alfa świadczeniobiorców z ciężką, aktywną postacią zeszywniającego zapalenia stawów kręgosłupa, 4. leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów lekami modyfikującymi o dużej i umiarkowanej aktywności choroby w warunkach ambulatoryjnych, 5. leczenie raka nerki.

